

## Élément

d'épreuve:ac84c10d-4e73-4469-9ddc-005798aab016

### Question 1 : (Type: QRU)

M. B, 27 ans, arrive aux urgences suite à un accident de voiture. A l'examen clinique, il présente : une atteinte de la sensibilité proprioceptive et épicritique droite sous mamelonnaire, un syndrome pyramidal du membre inférieur droit, et une atteinte de la sensibilité thermoalgique gauche sous mamelonnaire. Vous concluez à un syndrome médullaire, quelle est la réponse exacte ?

- ☐ *Faux* A. un syndrome de Brown Sequard droit de niveau T6
- ☐ *Faux* B. un syndrome de Brown Sequard gauche de niveau T6
- ☒ *Valide* C. un syndrome de l'hémimoelle droite de niveau T4
- ☐ *Faux* D. un syndrome syringomyélique gauche de niveau T4
- ☐ *Faux* E. un syndrome cordonal postérieur droit de niveau T6

### Question 2 : (Type: QRP)

Mme N, 65 ans, est suivie pour une myasthénie autoimmune généralisée depuis 2 ans. Dans le cadre de sa prise en charge, elle prend depuis un an de la prednisone à la dose de 20mg/jour. Dans le cadre du suivi de sa corticothérapie au long cours, quels sont les 3 éléments du bilan régulier que vous devez prévoir ?

0 réponses attendues.

- ☒ *Valide* A. une glycémie à jeun régulière
- ☒ *Valide* B. une ostéodensitométrie annuelle
- ☒ *Valide* C. une surveillance de la pression artérielle régulière
- ☐ *Faux* D. un suivi trimestriel de la fonction rénale
- ☐ *Faux* E. un suivi dermatologique annuel
- ☐ *Faux* F. une surveillance ophtalmologique annuelle

### Question 3 : (Type: QRM)

Mademoiselle A., 19 ans, sans antécédents médicaux, vous voit en consultation pour des troubles sensitifs des membres inférieurs à type de paresthésies évoluant depuis 4 jours, d'apparition progressive. Quels arguments vous permettent de vous orienter vers une origine centrale des symptômes ?

- ☒ *Valide* A. un signe de Babinski droit
- ☒ *Valide* B. l'existence d'un niveau médullaire sensitif
- ☐ *Faux* C. l'abolition des réflexes ostéo tendineux
- ☐ *Faux* D. l'existence d'une atteinte proprioceptive des membres inférieurs

- ☒ Valide E. l'existence d'une trépidation épileptoïde de la cheville gauche

**Question 4 : (Type: QRP)**

Mme B, 40 ans, consulte ce jour pour des céphalées récidivantes. Elle n'a aucun antécédent. Elle vous rapporte des céphalées à type d'hémicranies, peu intenses mais durant environ 48 heures à chaque épisode. Cela ne l'empêche pas de poursuivre ses activités quotidiennes et elle est facilement soulagée par la prise de paracétamol. Ces céphalées sont régulièrement accompagnées de nausées. Quels sont les 4 éléments de l'interrogatoire qui vous permettent d'évoquer le diagnostic de migraine sans aura ?

0 réponses attendues.

- ☒ Valide A. l'existence d'épisodes stéréotypés
- ☐ Faux B. la faible intensité des céphalées
- ☒ Valide C. la localisation à type d'hémicranie
- ☐ Faux D. l'absence de retentissement sur les activités quotidiennes
- ☒ Valide E. la durée des symptômes
- ☒ Valide F. l'existence de nausées pendant les céphalées

**Question 5 : (Type: QRU)**

Vous venez de diagnostiquer une maladie de parkinson à M. X, 72 ans, qui présente un tremblement de repos asymétrique modéré évoluant depuis 2 ans. Il ne présente pas de gêne à la marche mais son tremblement a un retentissement sur sa vie quotidienne. Vous décidez de prescrire un traitement de première intention. Quelle est la réponse exacte ?

- ☐ Faux A. un agoniste dopaminergique
- ☒ Valide B. de la L-Dopa
- ☐ Faux C. un traitement anticholinestérasique
- ☐ Faux D. un traitement anticholinergique
- ☐ Faux E. un neuroleptique à faible dose