

Élément d'épreuve:dc546b91-d6e3-4622-b36c-596b59d8ee18

Question 1 : (Type: QRM)

La qualité et la fréquence des interactions parents-enfants jouent un rôle clé dans le développement

- ☒ Valide A. Du langage
- ☒ Valide B. Du raisonnement
- ☒ Valide C. De l'attention
- ☒ Valide D. Du sentiment de sécurité interne
- ☒ Valide E. De la socialisation

Question 2 : (Type: QRM)

Concernant le trouble bipolaire de type 1

- ☒ Indispensable A. Il correspond à la survenue d'un ou plusieurs épisode(s) maniaque(s)
- ☐ Faux B. Il n'est pas associé à une altération du profil cognitif
- ☐ Faux C. Il ne peut s'accompagner d'idées délirantes et d'hallucinations
- ☐ Faux D. Il débute classiquement dans l'enfance
- ☒ Valide E. Le sexe ratio est de 1

Question 3 : (Type: QRM)

Quelle(s) propositions s'appliquent à la crise suicidaire?

- ☒ Valide A. Le degré d'urgence du projet suicidaire est élevé si l'intention a été communiqué à un tiers
- ☒ Valide B. La déscolarisation est un facteur de vulnérabilité de l'émergence d'une crise suicidaire
- ☐ Faux C. On estime à 5 % la fréquence de récurrence après une tentative de suicide
- ☒ Valide D. Les enfants peuvent exprimer des idées et des intentions suicidaire dès l'âge de 5 ans.
- ☒ Valide E. Chez l'adolescent, la crise suicidaire peut se manifester dans un contexte de maltraitance

Question 4 : (Type: QRM)

Concernant les troubles des conduites alimentaires (TCA)

- ☐ Faux A. Ils ont une prévalence masculine prédominante

- ☒ Valide B. L'hyperthyroïdie peut être un diagnostic différentiel
- ☒ Valide C. La moitié des patient présentant un TCA de type anorexie mentale évolueront vers une rémission complète des troubles
- ☐ Faux D. Le PICA correspond à la régurgitation répétée de nourriture
- ☒ Valide E. L'ostéodensitométrie osseuse fait partie du bilan para-clinique de la boulimie si antécédent d'anorexie mentale

Question 5 : (Type: QRM)

Concernant les trouble du spectre de l'autisme quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) vraie(s)?

- ☐ Faux A. Ne peuvent être associés à un trouble anxieux
- ☐ Faux B. Ne peuvent être associés à un épisode dépressif caractérisé
- ☒ Valide C. l'épilepsie est une comorbidité fréquente
- ☐ Faux D. Ils peuvent apparaitre vers l'âge de 8 ans
- ☒ Valide E. Leur prévalence en population générale est de 1%