

Élément d'épreuve:d1a915ff-d6f7-4703-904f-ee12d45d623e

Question 1 : (Type: QRM)

Concernant la luxation congénitale de hanche (LCH), quelle(s) est(sont) la ou les réponse(s) exacte(s) ?

- ☒ *Valide* A. une limitation de l'abduction en deçà de 60° constitue un signe d'examen de LCH
- ☒ *Valide* B. l'instabilité est recherchée par la manoeuvre de Barlow
- ☐ *Faux* C. la première partie de la manoeuvre de Barlow est réalisée en mettant une pression axiale, abduction et rotation interne de hanche
- ☒ *Valide* D. la deuxième partie de la manoeuvre consiste en une traction axiale, abduction et pression sur le grand trochanter
- ☐ *Faux* E. l'échographie est la technique de dépistage de LCH

Question 2 : (Type: QRM)

Concernant le remodelage osseux des fractures de l'enfant, quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) ?

- ☐ *Faux* A. Il permet la reconstruction anatomique des fractures épiphysaires
- ☒ *Valide* B. Il est d'autant plus important que l'enfant est jeune
- ☒ *Valide* C. Il est plus important à la partie distale du fémur qu'à la partie distale de l'humérus
- ☐ *Faux* D. Il permet le plus souvent la correction des cals vicieux rotatoires
- ☐ *Faux* E. Toutes les réponses précédentes sont fausses

Question 3 : (Type: QRM)

Concernant la luxation congénitale de hanche (LCH). Quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) exacte(s) ?

- ☒ *Valide* A. une prise en charge adaptée dans les 5 premières semaines de vie permet d'obtenir dans la majorité des cas une guérison complète
- ☒ *Valide* B. le diagnostic de LCH après l'âge de 3 mois est dû à un échec du dépistage
- ☐ *Faux* C. le diagnostic de LCH à l'âge de la marche est de bon pronostic
- ☐ *Faux* D. plus l'enfant est âgé, plus la prise en charge est simple
- ☒ *Valide* E. le défaut de dépistage de LCH est un véritable enjeu de santé publique

Question 4 : (Type: QRM)

Un enfant de 6 mois émet une selle tous les 5 jours. Que demandez-vous?

- ☒ *Valide* A. date d'émission du méconium
- ☒ *Valide* B. âge de début de la constipation
- ☒ *Valide* C. mode d'alimentation
- ☐ *Faux* D. Présence d'un ictère néonatal
- ☒ *Valide* E. présence de diarrhées/vomissements associés

Question 5 : (Type: QRM)

Parmi les facteurs de risque suivants, lesquels sont des facteurs de risque de maltraitance concernant le responsable de l'enfant?

- ☒ *Valide* A. toxicomanie
- ☒ *Valide* B. troubles psychiatriques
- ☐ *Faux* C. grossesse tardive
- ☒ *Valide* D. chômage
- ☒ *Valide* E. antécédent de mort inopinée du nourrisson